



Buse variable © Marcel Burkhardt

Attaques de buses variables

Il arrive que des amateurs et amatrices de course à pied soient attaqués par des rapaces. Il s'agit dans la grande majorité des cas de buses variables. Ces attaques par surprise ont presque toujours lieu entre mai et juillet, lorsque les oiseaux ont des petits et qu'ils veulent se défendre contre ce qui s'apparente pour eux à un ennemi. Ces attaques simulées sont généralement inoffensives. Il est conseillé aux personnes pratiquant la course à pied d'éviter la zone ou de la traverser en marchant.

Qu'en est-il des attaques de buse ?

« Attaqué par une buse alors qu'il courait » est un titre d'article qui paraît chaque année. Effectivement, ce type d'attaque a lieu occasionnellement. Ce sont principalement les buses variables et exceptionnellement les milans qui sont parfois agressifs.

Les attaques surprises ont presque toujours lieu entre mai et juillet, quand les oiseaux ont des jeunes. Si des personnes

passent par hasard en courant près d'un nid ou près des jeunes fraîchement envolés, ils sont alors considérés comme un danger par les parents qui essaient de chasser l'ennemi présumé en l'attaquant. Parfois, ils crient en même temps avec insistance. La rage ne touche pas les oiseaux. Elle ne peut donc en aucun cas être à l'origine de l'attaque.

Les attaques ont lieu le plus souvent par derrière et presque toujours sur des personnes qui courent, alors que les

personnes à pied et les cyclistes ne sont pas importunés, cependant, là aussi, il y a des exceptions. Dans certains cas extrêmes, des amateurs et amatrices de course à pied peuvent être attaqués dans un rayon de 500 mètres autour du nid.

Les oiseaux peuvent-ils être dangereux pour nous ?

La plupart du temps, les buses se contentent d'attaques simulées. Dans



quelques rares cas, la victime est repartie avec des égratignures sur la tête. Aucune blessure sérieuse n'est généralement à déplorer. Même pour de petites blessures, il est conseillé de désinfecter la plaie et de vérifier si on est à jour dans ses vaccins contre le tétanos.

Que faire ?

Nous conseillons aux personnes concernées d'éviter pendant quelques semaines le lieu où ces attaques se produisent ou alors de marcher sur le tronçon concerné. Bien que la buse variable soit le rapace le plus fréquent de Suisse (plus de 15 000 couples nicheurs), ces attaques sont exceptionnelles. Chaque année, seule une douzaine de cas sont rapportés.



*Au vu de la fréquence des buses variables, les attaques sont extrêmement rares.
© Marcel Burkhardt*

IMPRESSUM

© Station ornithologique suisse et BirdLife Suisse, Sempach et Zurich, 2023
La reproduction du texte en citant la source est souhaitée.

Schweizerische Vogelwarte | Seerose 1 | 6204 Sempach | T +41 41 462 97 00 | info@vogelwarte.ch | www.vogelwarte.ch
BirdLife Schweiz | Postfach | 8036 Zürich | T +41 44 457 70 20 | info@birdlife.ch | www.birdlife.ch